

Anaftin® Gel

Anaftin® Gel pomaže u ublažavanju boli uzrokovane ranicama u ustima, kao što su ranice nastale usljed aftoznog stomatitisa, aftoznih čireva, kao i ranice nastale usljed nošenja ortodontskih aparatića i neodgovarajuće zubne protetike. Ovaj proizvod je također indiciran i za difuzne aftozne čireve.

Način djelovanja:

Anaftin® Gel sadrži polivinilpirolidon (PVP) i hijaluronsku kiselinu, koji tvore zaštitni sloj koji se lijepi uz zidove usne šupljine i djeluje kao mehanička zaštita zahvaćenih površina, čime se ublažava bol izazvana ogoljenim nervnim završecima. Hijaluronska kiselina i Aloe vera u ovoj formuli pospješuju proces prirodnog zacjeljivanja oštećenog tkiva.

Uputstvo za upotrebu:

Nanijeti 1 do 2 kapljice gela kako bi se prekrilo čitav čir ili ranica u ustima. Izbjegavati direktan kontakt aplikatora sa ranicom. Ne dodirivati ranicu jezikom najmanje 2 minute kako bi se omogućilo formiranje zaštitnog sloja. Nakon svake primjene zatvoriti zaštitnu kapicu. Za postizanje najboljih rezultata treba izbjegavati jelo i piće najmanje 1 sat nakon primjene.

Upotreba 3 - 4 puta dnevno, a po potrebi i češće.

Sastojci:

Voda, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizirano ricinusovo ulje, ksantan guma, kalij sorbat, natrij benzoat, natrij hijaluronat, aroma, benzalkonij hlorid, dinatrij EDTA, natrij saharin, dikalijev glicirizat, Aloe vera.

Upozorenje:

Tube Anaftin® Gela treba koristiti individualno, kako bi se izbjeglo prenošenje zaraze preko aplikatora i gela. Upotreba Anaftin® Gela je kontraindicirana kod svih pacijenata sa poznatom preosjetljivošću na bilo koji od sastojaka. Ako ste trudni, prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se s ljekarom. Ako često patite od čireva u ustima, preporučuje se da potražite savjet ljekara.

Mjere opreza i upozorenja:

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe, ako je tuba oštećena ili ako iz nje curi gel. Držati van pogleda i dohvata djece. Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od direktnog izvora toplote. Ne zamrzavati.

Sadržaj:

8 ml

Proizvođač:

Alliance Pharma S.r.l.,
Milano, Italija



Zastupnik za Bosnu i Hercegovinu:

Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o.
Hasana Brkića 2/II 71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Datum revizije: 05/2021

BA / V140227/01

Anaftin® Gel



V-No.:	V140227/01	TW-No.:	188315	BC-No.:	21-1775	Approved for printing:
Package:	N/A	Language:	Bosnian			
Size:	150 x 210 mm	Weight:	N/A			
Printing colours:	1. Pantone 648	Braille transcrip.:	N/A			
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A	
Add. Info:	N/A	Date:	16.06.2021	Melchert		